

國立屏東商業技術學院 95 學年度碩士班暨碩士在職專班入學考試試題

國際企業研究所 <一般生>

統計學

注意：

- 1.本試題均為問答題，共計五題。請依序並標明題號作答於答案卷上。
- 2.試題隨答案卷一併繳回。

一、某甲在宿舍桌上放了一包餅乾，上課回來後發現餅乾被吃了一半。根據觀察，有可能是某甲的兩位室友某乙與某丙所吃掉。依照兩人平時作息評估，事發當天某乙回宿舍的機率為 0.5，某丙回宿舍的機率是 0.6。依現場判斷，某乙與某丙當天並未同時回到宿舍。另依據兩人個性，某乙看到宿舍桌上餅乾，並將其吃掉的機率為 0.2，某丙看到宿舍桌上餅乾，並將其吃掉的機率是 0.3。請您依照目前線索評估，某丙吃掉餅乾的機率為多少？(20 分)

二、某液晶面板廠商想要研發 25 平方英吋大小的面板，假設面板上出現亮點的個數服從卜松分配(poisson distribution)，亮點的期望個數為 1 個。請問一個 25 平方英吋大小面板出現超過 1 個亮點的機率為多少？假設該廠商也打算開發 50 平方英吋大小的面板，在其他假設條件不變的情況下，請問 50 平方英吋面板出現超過 1 個亮點的機率為多少？(20 分)

三、已知二變數 X、Y，樣本個數為 20 個，其它之樣本資料如下：

$$\sum x_i = 260, \sum y_i = 360, \sum x_i^2 = 4,404, \sum y_i^2 = 6,669, \sum x_i y_i = 4,416$$

(1) 以一般最小平方方法 (ordinary least squares method ; OLS) 求得 X、Y 直線方程式

$$\hat{y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x, \text{ 試問 } \hat{\beta} = ? (10 \text{ 分})$$

(2) 此迴歸模式的判定係數(coefficient of determination)為何？(10 分)

四、某生自二獨立常態母群體  $N(\mu_1, \sigma^2)$ ， $N(\mu_2, \sigma^2)$  分別隨機抽取兩組樣本，已知第一組樣本個數  $n_1 = 16$ ，樣本平均數  $\bar{x}_1 = 95$ ，樣本變異數  $s_1^2 = 9.4$ ；第二組樣本個數  $n_2 = 9$ ，樣本平均數  $\bar{x}_2 = 98$ ，樣本變異數  $s_2^2 = 8.25$ 。

- (1) 請您估計此二獨立常態母群體平均數差  $\mu_1 - \mu_2$  的 95%信賴區間。(10 分)
- (2) 在顯著水準 5%下，請您利用信賴區間法，判定此二獨立常態母群體平均數是否有顯著差異？(10 分)

五、某連鎖超商為增加各店單日營業額而推出促銷活動，已知各店單日營業額服從常態分配，原營業額平均數為 25,000 元，其變異數不因實施促銷活動而改變。若隨機抽取 25 處門市據點，單日營業額樣本平均數為 27,500 元，樣本標準差為 6,250 元。

- (1) 請您寫出此假設檢定的虛無假設與對立假設。(10 分)
- (2) 試問抽樣調查檢定結果之 p 值為何？(10 分)

參考資料：

|                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $e^{-1}=0.3679$       | $e^{-2}=0.1353$       | $Z_{0.05}=1.645$      | $Z_{0.025}=1.96$      |
| $t_{0.025}(8)=2.306$  | $t_{0.025}(9)=2.262$  | $t_{0.025}(15)=2.131$ | $t_{0.025}(16)=2.120$ |
| $t_{0.025}(23)=2.069$ | $t_{0.025}(24)=2.064$ | $t_{0.025}(25)=2.060$ | $t_{0.02847}(24)=2$   |
| $t_{0.02824}(25)=2$   |                       |                       |                       |